

**1.** Чоловік віком 54 роки скаржиться на гіркоту в роті та тупий ниючий біль у правому підребер'ї, що виникає після вживання смаженої їжі та іррадіює в ділянку правого плеча. Під час пальпації живота спостерігаються болючість у ділянці правого підребер'я та позитивні симптоми Ортнера, Кера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Гострого холецистити
- B.** Гострого гастриту
- C.** Гострого панкреатиту
- D.** Гострого коліту
- E.** Гострого гепатиту

**2.** Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього захворювання?

- A.** Червоний
- B.** Безбарвний
- C.** Каламутний
- D.** Жовтувато-зеленуватий
- E.** Прозорий

**3.** Чоловік віком 45 років скаржиться на різкий біль у потиличній ділянці голови, запаморочення, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, обличчя гіперемоване, пульс — 92/хв, напружений, ритмічний, АТ — 190/100 мм рт. ст., тони серця ослаблені, акцент другого тону над аортою. Який препарат використовується для надання невідкладної допомоги у цьому разі?

- A.** Магнію сульфат
- B.** Кордіамін
- C.** Анальгін
- D.** Адреналін
- E.** Димедрол

**4.** Чоловік, який хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного перенавантаження раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці на світло не реагують, гіперемія обличчя, пульс — 110/хв, напружений, АТ — 200/110 мм рт. ст., лівий кут рота опущений, лівостороння геміплегія. Яке положення тіла треба надати пацієнту під час надання допомоги?

- A.** На спині, з піднятим головним кінцем ліжка
- B.** На спині, з піднятим ножним кінцем ліжка
- C.** На животі, з повернутою на бік головою
- D.** На правому боці, з відхиленою назад головою
- E.** На лівому боці, з відхиленою назад головою

**5.** Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерний такий результат дослідження?

- A.** Бронхіальної астми
- B.** Гострого бронхіту
- C.** Бронхоектатичної хвороби
- D.** Туберкульозу легень
- E.** Сухого плевриту

**6.** У пацієнта інфекційного стаціонару спостерігається тяжкий загальний стан, акроціаноз, сухість шкіри, загострення рис обличчя, блювання «фонтаном», діарея більше 15 разів на добу, періодичні судоми. Випорожнення водянисті, каламутні, з білими пластівцями. Який механізм розвитку діареї у пацієнта?

- A.** Секреторний
- B.** Ексудативний
- C.** Осмотичний
- D.** Запальний
- E.** Інвазивний

**7.** Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, слабкість, зниження апетиту, біль у суглобах упродовж двох тижнів. З анамнезу відомо, що чоловік вживає ін'єкційні наркотики. Під час об'єктивного обстеження виявлено: жовтяниця шкіри і склер, збільшення печінки та селезінки, сеча темного кольору, випорожнення знебарвлені. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- A.** Вірусного гепатиту С
- B.** Лептоспірозу
- C.** ВІЛ-інфекції
- D.** Висипного тифу
- E.** Кишкового ієрсиніозу

**8.** Жінка скаржиться на гіркий присмак у роті, печію, нудоту і відрижку повітрям після вживання жирної та смаженої їжі. Для якого синдрому характерні ці клінічні прояви?

- A.** Шлункової диспепсії
- B.** Кишкової диспепсії
- C.** Больового синдрому
- D.** Інтоксикаційного синдрому
- E.** Астеновегетативного синдрому

**9.** У пацієнта попередній діагноз: загострення хронічного панкреатиту. Яке дослідження проводиться для уточнення діагнозу?

- A.** Аналіз сечі на  $\alpha$ -амілазу
- B.** Аналіз крові на білірубін
- C.** Аналіз калу на приховану кров
- D.** Аналіз крові на креатинін
- E.** Аналіз сечі на глюкозу

**10.** У чоловіка віком 54 роки спостерігається головний біль, шум у вухах, запаморочення та стійке підвищення артеріального тиску (АТ — 160/100 мм рт. ст.). Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Артеріальна гіпертензія
- B.** Інфаркт міокарда
- C.** Стенокардія
- D.** Ішемічний інсульт
- E.** Серцева астма

**11.** Чоловік віком 79 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на озноб, пітливість, слабкість, задишку та появу нестерпного болю в ділянці серця, що поширюється на ліву руку та не проходить після приймання нітрогліцерину. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- A.** Інфаркту міокарда
- B.** Артеріальної гіпертензії
- C.** Стенокардії
- D.** Серцевої астми
- E.** Пневмонії

**12.** Чоловік віком 50 років скаржиться на загальну слабкість, свербіння шкіри, тупий ниючий біль у правому підбер'ї, здуття живота, закрепи, що чергуються з діареєю. Об'єктивно спостерігається: збільшення печінки, судинні зірочки на шкірі, розширення венозної сітки навколо пупка, асцит, гінекомастія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Цирозу печінки
- B.** Хронічного гепатиту
- C.** Вірусного гепатиту
- D.** Хронічного холециститу
- E.** Жовчнокам'яної хвороби

**13.** Пацієнт скаржиться на надсадний

кашель, прогресуючу задишку, біль у грудній клітці, кровохаркання. Попередній діагноз — рак легень. До якого обстеження треба підготувати пацієнта для уточнення діагнозу?

- A.** Бронхоскопії з біопсією
- B.** Електрокардіографії
- C.** ФГДС із біопсією
- D.** Колоноскопії
- E.** Іригоскопії

**14.** Який розчин використовується для промивання постійного катетера Фолея?

- A.** 0,02% р-н фурациліну
- B.** 5% р-н глюкози
- C.** 2% р-н натрію гідрокарбонату
- D.** 3% р-н хлораміну
- E.** 6% р-н перекису водню

**15.** Жінка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, прискорене серцебиття, порушення смаку (бажання їсти крейду), блідість та сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Для якого виду анемії характерні ці симптоми?

- A.** Залізодефіцитної
- B.** Фолієводефіцитної
- C.** Гемолітичної
- D.**  $B_{12}$ -дефіцитної
- E.** Гіпопластичної

**16.** Пацієнтка після струмектомії скаржиться на млявість, загальну слабкість, зниження працездатності та пам'яті, мерзлякуватість, підвищену сонливість. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, лущиться, не береться в складку, волосся сухе, ламке, випадає. Пульс — 54/хв, ритмічний, АТ — 100/60 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Гіпотиреозу
- B.** Гіпертиреозу
- C.** Цукрового діабету
- D.** Атеросклерозу
- E.** Акромегалії

**17.** Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?

- A.** Частота, тривалість та інтенсивність перейм
- B.** Артеріальний тиск
- C.** Серцебиття плода
- D.** Температура тіла
- E.** Частота та ритмічність пульсу

**18.** У жінки в терміні вагітності 35—36 тижнів спостерігаються головний біль, нудота, блювання, миготіння мушок перед очима, генералізовані набряки. Під час огляду виявлено: жінка загальмована, артеріальний тиск — 185/110 мм рт. ст, матка збільшена відповідно до терміну вагітності, в нормотонусі, положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття плода чітке, ритмічне, 140/хв. В аналізі сечі протеїнурія — 6 г/л. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- A.** Прееклампсії тяжкого ступеня
- B.** Прееклампсії середнього ступеня
- C.** Прееклампсії легкого ступеня
- D.** Еклампсії
- E.** Артеріальної гіпертензії

**19.** У жінки на другий день після діагностичного вишкрібання порожнини матки підвищилася температура тіла до 38°C, з'явилися біль унизу живота та слизово-гнійні виділення з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: матка збільшена, болюча, м'яка. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування цього ускладнення?

- A.** Антибактеріальні
- B.** Глюокортикоїди
- C.** Цитостатики
- D.** Седативні
- E.** Гемостатики

**20.** Під час оцінювання стану новонародженої дитини на 1-й хвилині життя виявлено: ЧСС — 120/хв, дихання регулярне, крик голосний, шкіра рожева, рухи активні, реакція на подразники жвава. Оцініть стан новонародженого за шкалою Апгар.

- A.** 10 балів
- B.** 2 бали
- C.** 5 балів
- D.** 4 бали
- E.** 7 балів

**21.** До пологового відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 26—27 тижнів, яка скаржиться на появу незначних кров'янистих виділень з піхви вночі, в стані спокою. На момент огля-

ду кровотеча припинилася, загальний стан задовільний. Який метод діагностики треба провести для уточнення діагнозу в цьому разі?

- A.** Трансвагінальне УЗД
- B.** Зовнішнє акушерське обстеження
- C.** Внутрішнє акушерське обстеження
- D.** Амніоскопію
- E.** Кольпоскопію

**22.** Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- A.** Гідротубація
- B.** Пертубація
- C.** Лапароскопія
- D.** Кольпоскопія
- E.** Гістероскопія

**23.** Яка контрастна речовина використовується для ректального введення під час рентгенологічного обстеження товстої кишки?

- A.** Барію сульфат
- B.** Верографін
- C.** Біліграфін
- D.** Уротраст
- E.** Холевід

**24.** Під час проведення внутрішнього акушерського дослідження роділлі виявлено: шийка матки згладжена та розкрита на 8 см, плодовий міхур відсутній, пальпується підборіддя, щелепи та піднебіння плода. Яке передлежання плода у порожнині матки?

- A.** Лицьове
- B.** Передньоголовне
- C.** Лобне
- D.** Потиличне
- E.** —

**25.** Жінка отримала опік окропом передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження.

- A.** 37%
- B.** 25%
- C.** 39%
- D.** 51%
- E.** 19%

**26.** Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться введенням вакцини БЦЖ внутрішньошкірно. Яке ускладнення розвивається у разі

випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

- A.** «Холодний абсцес»
- B.** Ліподистрофія
- C.** Олійна емболія
- D.** Виразка
- E.** Інфільтрат

**27.** Семирічна дитина скаржиться на біль в епігастрії, періодичні нудоту, відрижку повітрям, печію, відчуття важкості у шлунку. Які особливості підготовки дитини до дослідження на *Helicobacter Pylori*?

- A.** Припинити приймання антибіотиків за 4–6 тижнів до дослідження
- B.** Уникати чищення зубів і полоскання рота зранку перед дослідженням
- C.** Застосувати очисну клізму напередодні
- D.** Приймати проносні засоби упродовж 3-х днів до дослідження
- E.** Перед обстеженням збільшити вживання рідини

**28.** Вкажіть віддалене ускладнення генітального туберкульозу у жінок.

- A.** Безпліддя
- B.** Субфебрилітет
- C.** Порушення менструального циклу
- D.** Швидка втомлюваність
- E.** Підвищена пітливість

**29.** До гінекологічного відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 16 тижнів зі скаргами на інтенсивний переймоподібний біль унизу живота та кров'янисті виділення зі статевих шляхів. За результатами ургентного ультразвукового обстеження діагностовано неповний аборт (залишки плодового яйця залишилися в порожнині матки). До якої лікувальної маніпуляції сестрі медичній треба підготувати набір інструментів?

- A.** Діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки
- B.** Пункції заднього склепіння піхви
- C.** Зондування порожнини матки
- D.** Кольпоскопії
- E.** Гістеросальпінгографії

**30.** У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість, облісіння потилиці, здуття живота. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Рахіту
- B.** Спазмофілії
- C.** Гіпервітамінозу D
- D.** Алергічного діатезу
- E.** Гіпотрофії

**31.** Під час парентерального введення камфорової олії сестра медична після введення шприца відтягнула його поршень на себе. Профілактику якого ускладнення вона виконала?

- A.** Медикаментозної емболії
- B.** Інфільтрату
- C.** Гематоми
- D.** Повітряної емболії
- E.** Некрозу

**32.** Вкажіть метод специфічної профілактики туберкульозу, що проводиться особам, які перебувають у контакті з пацієнтом, хворим на активну форму туберкульозу.

- A.** Хіміопрофілактика ізоніазидом
- B.** Хіміопрофілактика стрептоміцином
- C.** Щеплення вакциною БЦЖ
- D.** Ревакцинація вакциною БЦЖ
- E.** Проведення проби Манту

**33.** Пацієнт, який збирає сечу для дослідження за методом Зимницького, повідомив сестру медичну про те, що не може зібрати сечу в третій контейнер, у зв'язку з відсутністю позиву до сечовипускання. Яка тактика сестри медичної у цьому разі?

- A.** Третій контейнер залишити порожнім
- B.** Дати пацієнту випити води
- C.** Увести пацієнту сечогінний препарат
- D.** Застосувати методи рефлекторного виклику акту сечовипускання
- E.** Виконати катетеризацію сечового міхура

**34.** Для якого захворювання характерні такі зміни в загальному аналізі сечі: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л)?

- A.** Гострого пієлонефриту
- B.** Гострого гломерулонефриту
- C.** Хронічного гломерулонефриту
- D.** Сечокам'яної хвороби
- E.** Ниркової недостатності

**35.** Яке положення тіла потрібно надати шестирічній дитині, у якої після введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок?

- A.** На спині, з повернутою на бік головою
- B.** На животі
- C.** Напівсидяче
- D.** На лівому боці
- E.** На спині, з припіднятими ногами

**36.** У юнака віком 20 років після укусу бджоли з'явилися: щільний набряк повік і губ, захриплість голосу, «гавкаючий» кашель, відчуття нестачі повітря. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, дихання утруднене, обличчя бліде та набрякле, ціаноз губ. Пульс — 86/хв, ритмічний, АТ — 120/80 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Набряк Квінке
- B.** Астматичний стан
- C.** Кропив'янка
- D.** Анафілактичний шок
- E.** Синдром Лайєлла

**37.** Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилі тулуба в протилежний бік. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці. Дихання часте, поверхнєве. Температура тіла — 37,4°C. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно над легеньми спостерігається чіткий легеневий звук. Аускультативно вислуховується шум тертя плеври. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- A.** Сухого плевриту
- B.** Міжреберної невралгії
- C.** Гострого бронхіту
- D.** Ексудативного плевриту
- E.** Негоспітальної пневмонії

**38.** Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,5°C, набряк і почервоніння п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобів обох кистей та обмеження їхньої рухомості, кисті мають вигляд «ластів моржа». Який лабораторний показник найдоцільніше визначити в цьому разі?

- A.** Ревматоїдний фактор
- B.** АлАТ, АсАТ
- C.** С-реактивний білок
- D.** Білірубін
- E.** Сечову кислоту

**39.** Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- A.** Спірографія
- B.** Бронхоскопія
- C.** Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- D.** УЗД легень
- E.** Шкірні алергологічні тести

**40.** На яку глибину вводиться газовідвідна трубка в пряму кишку дорослим пацієнтам для усунення метеоризму?

- A.** 20–30 см
- B.** 15–20 см
- C.** 10–15 см
- D.** 5–10 см
- E.** 3–4 см

**41.** Пацієнт ендокринологічного відділення скаржиться на прискорене серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення сну, схуднення на тлі підвищення апетиту. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, тремор пальців рук, шкіра волога, тепла, температура тіла — 37,2°C, пульс — 100/хв, АТ — 150/90 мм рт. ст., екзофтальм, позитивний симптом Грефе, збільшення щитоподібної залози, тони серця звучні, систолічний шум на верхівці. Яке дослідження треба провести для визначення функції щитоподібної залози?

- A.** Аналіз крові на тиреоїдні гормони
- B.** УЗД щитоподібної залози
- C.** Аналіз крові на глюкозу
- D.** Загальний аналіз крові
- E.** МРТ головного мозку

**42.** До сімейного лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту та тупий ниючий біль в епігастральній ділянці, який виникає за 15–30 хв після вживання їжі. Захворювання пов'язує з нерегулярним харчуванням. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки блідо-рожеві, язик вкритий білим нальотом. Живіт під час пальпації м'який, болючий в епігастральній ділянці. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Виразкової хвороби шлунку
- B.** Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
- C.** Хронічного гіпоацидного гастриту
- D.** Раку шлунку
- E.** Хронічного панкреатиту

**43.** Чоловік віком 50 років скаржиться на різкий, інтенсивний, стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, ліве плече та ліву лопатку. Біль триває упродовж двох годин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, відчуває страх смерті, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, ціаноз губ, пульс — 84/хв, ритмічний, АТ — 130/80 мм рт. ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ спостерігається патологічний зубець Q у відведеннях I, aVL і V1- V2. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

- A.** Q-інфаркт міокарда, ангінозна форма
- B.** Q-інфаркт міокарда, астматична форма
- C.** Q-інфаркт міокарда, гастралгічна форма
- D.** Q-інфаркт міокарда, аритмічна форма
- E.** —

**44.** Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 60 мг 4% розчину гентаміцину сульфату. В ампулах по 2 мл міститься 80 мг цього антибіотика. Скільки мілілітрів препарату треба набрати в шприц для виконання ін'єкції?

- A.** 1,5 мл
- B.** 1 мл
- C.** 2 мл
- D.** 0,5 мл
- E.** 3 мл

**45.** Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту треба дотримуватися ліжкового режиму?

- A.** Кишкової кровотечі
- B.** Генералізації інфекції
- C.** Рецидиву захворювання
- D.** Розриву селезінки
- E.** Печінкової недостатності

**46.** У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтуватого-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «сим-

птом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Висівкоподібного лишаю
- B.** Дерматиту
- C.** Екземи
- D.** Токсикодермії
- E.** Мікроспорії

**47.** У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи спостерігаються гіперемія шкіри та поява дрібних пухирців із гнійним умістом, покритих жовтими кірками, піднижньоцелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні ці симптоми?

- A.** Сикозу
- B.** Кандидозу
- C.** Мікроспорії
- D.** Імпетиго
- E.** Фурункулу

**48.** До жіночої консультації звернулася жінка у терміні вагітності 36 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: обвід живота — 98 см, ВСДМ — 40 см, вислуховується серцебиття — 146/хв справа вище від пупка і 160/хв зліва нижче пупка. Визначте вид вагітності.

- A.** Багатоплідна
- B.** Переношена
- C.** Одноплідна
- D.** Несправжня
- E.** Завмерла

**49.** У жінки в терміні вагітності 33 тижні спостерігається збільшення маси тіла — 500 г за тиждень та підвищення АТ — 150/90 мм рт. ст. Яке додаткове лабораторне дослідження треба провести жінці насамперед?

- A.** Визначення білка в сечі
- B.** Загальний аналіз крові
- C.** Біохімічний аналіз крові
- D.** Бактеріологічне дослідження сечі
- E.** Коагулограма

**50.** У чоловіка віком 58 років, який хворіє на цироз печінки, раптово з'явилися такі симптоми: збудження змінилося на сонливість, нудота, блювання, посмикування м'язів обличчя та кінцівок, з рота відчувається запах аміаку, температура тіла 39–40°C, спостерігається дихання Чейна-Стокса. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- A.** Печінкова кома
- B.** Шлункова кровотеча
- C.** Пенетрація
- D.** Бактеріальний перитоніт
- E.** Перфорація

**51.** Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?

- A.** Бактеріологічний
- B.** Хімічний
- C.** Фізичний
- D.** Візуальний
- E.** Інструментальний

**52.** Жінку в терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть ознаку початку пологової діяльності у жінки.

- A.** Регулярні перейми
- B.** Часте сечовипускання
- C.** Розкриття шийки матки
- D.** Опущення дна матки
- E.** Біль у ділянці крижів

**53.** Породілля на 4 добу після пологів скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 39°C та гнійно-кров'янисті, каламутні, з неприємним запахом виділення з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: матка м'якої консистенції, чутлива під час пальпації. Яке ускладнення післяпологового періоду розвинулося у жінки?

- A.** Гострий ендометрит
- B.** Гострий пельвіоперитоніт
- C.** Гострий перитоніт
- D.** Гострий кольпіт
- E.** Гострий аднексит

**54.** З якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла людини?

- A.** Для уникнення запаморочення
- B.** Для попередження підвищення температури тіла
- C.** Для підсилення лікувального ефекту
- D.** Для кращої взаємодії з назальними краплями
- E.** Для попередження виникнення кашлю

**55.** Який збудник найчастіше спричиняє розвиток післяпологового маститу?

- A.** Золотистий стафілокок
- B.** Епідермальний стафілокок
- C.** Анаеробні коки
- D.** Протей
- E.** Стрептокок

**56.** Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та серединою верхньо-внутрішнього краю лобкового симфізу?

- A.** Прямий
- B.** Поперечний
- C.** Інтерспінальний
- D.** Косий
- E.** —

**57.** У жінки на 31 тижні вагітності розпочалися пологи та з'явилася кровотеча з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: шийка матки розкрита на 8 см, внутрішнє вічко на 1/3 перекрите м'якою, губчастою тканиною, поруч пальпується навколоплідний міхур. У роділлі спостерігається активна пологова діяльність. Вкажіть вид передлежання плаценти.

- A.** Бокове
- B.** Крайове
- C.** Центральне
- D.** Оболонкове
- E.** Низьке

**58.** Вкажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

- A.** Затримка частин плаценти
- B.** Щільне прикріплення плаценти
- C.** Порушення зсідання крові
- D.** Защемлення плаценти
- E.** Порушення виділення плаценти

**59.** Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

- A.** За Оберстом-Лукашевичем
- B.** За Вишневським
- C.** Термінальна
- D.** Інфільтраційна
- E.** Внутрішньокісткова

**60.** У чоловіка виявлено відкритий перелом середньої третини лівого стегна. Із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. Який тимчасовий метод спинення кровотечі потрібно застосувати в цьому разі?

- A.** Накладання артеріального джгута
- B.** Туга тампонада рани
- C.** Максимальне згинання кінцівки в суглобі
- D.** Тиснуча пов'язка
- E.** Підвищене положення кінцівки

**61.** Пацієнтка після апендектомії скаржиться на дворазове блювання, затримку газів і відсутність випорожнень. Об'єктивно спостерігається: шкіра землистого кольору, язик сухий, обкладений білим нальотом, передня черевна стінка напружена. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки в ранньому післяопераційному періоді?

- A.** Парез кишечника
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гострий панкреатит
- D.** Гострий перитоніт
- E.** Гострий аднексит

**62.** Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт приймає участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для обстеження всіх відділів товстого кишечника та взяття біопсії?

- A.** Колоноскопія
- B.** Оглядовий рентген-знімок черевної порожнини
- C.** Тригоскопія
- D.** УЗД
- E.** Комп'ютерна томографія

**63.** Жінка після ДТП скаржиться на біль і відсутність рухів у ділянці лівої ключиці. Під час огляду виявлено вкорочення лівого надпліччя, його деформацію та набряк, згладження надключичної ямки. Для якого ушкодження характерні ці симптоми?

- A.** Перелому ключиці без зміщення кісткових уламків
- B.** Відкритого перелому ключиці
- C.** Перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків
- D.** Вивиху ключиці
- E.** Забою у ділянці ключиці

**64.** Чоловік скаржиться на сильний біль у поперековій ділянці та часті позиви до сечовипускання, нудоту. Пацієнт збуджений, метушливий. Під час огляду шкірні покриви бліді, симптом Пастер-

нацького позитивний з правого боку. Яку тактику треба застосувати насамперед для полегшення стану пацієнта?

- A.** Тепло на поперекову ділянку
- B.** Холод на поперекову ділянку
- C.** Уведення сечогінних препаратів
- D.** Уведення спазмолітичних препаратів
- E.** Уведення знеболювальних засобів

**65.** У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово виникла шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігаються у разі цього невідкладного стану?

- A.** Тахікардія, зниження АТ
- B.** Брадикардія, підвищення АТ
- C.** Брадикардія, зниження АТ
- D.** Тахікардія, підвищення АТ
- E.** Аритмія, АТ не змінюється

**66.** Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фамотидин. Яка основна фармакологічна дія цього лікарського засобу?

- A.** Антисекреторна
- B.** Антигістамінна
- C.** Бактеріостатична
- D.** Бактерицидна
- E.** Спазмолітична

**67.** Під час догляду за пацієнтом із хронічною серцевою недостатністю сестра медична звернула увагу на збільшення маси тіла пацієнта та зменшення виділення кількості сечі. Аналіз водного балансу встановив, що добовий діурез пацієнта становить 50% від кількості прийнятої рідини. Зробіть висновок за результатами обстеження.

- A.** Поява прихованих набряків
- B.** Зневоднення
- C.** Порушення метаболізму
- D.** Ожиріння
- E.** —

**68.** Як називається спеціалізований медичний заклад стаціонарного типу, де проводиться паліативне лікування пацієнтів із невиліковними хворобами?

- A.** Хоспіс
- B.** Клініка
- C.** Санаторій
- D.** Амбулаторія
- E.** Поліклініка

**69.** Які продукти треба обмежити в харчовому раціоні пацієнта, у якого вияв-



лено здуття живота та метеоризм?

- A.** Капусту, бобові
- B.** М'ясо, печінку
- C.** Каву, міцний чай
- D.** Яйця, гречану крупу
- E.** Яблука, гарбуз

**70.** Пацієнт скаржиться на біль унизу живота та часті рідкі випорожнення (спочатку калового характеру, а потім мізерні, з домішками слизу та крові по типу «ректального плювка»). Під час пальпації живота спостерігається біль та виражений спазм у ділянці сигмоподібної кишки. З боку інших органів патології не виявлено. Який лабораторний метод діагностики треба застосувати для підтвердження діагнозу?

- A.** Бактеріологічний
- B.** Копрологічний
- C.** Загальний аналіз крові
- D.** Біохімічний аналіз крові
- E.** Аналіз крові на глюкозу

**71.** Пацієнт скаржиться на озноб, гарячку, профузне потовиділення, що повторюються кожні три дні. З анамнезу відомо, що тиждень тому повернувся з Африки. Об'єктивно спостерігається: температура тіла 40°C, шкіра обличчя гіперемована, у легенях жорстке дихання, живіт пальпаторно безболісний, печінка та селезінка збільшені. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Малярії
- B.** Лептоспірозу
- C.** Висипного тифу
- D.** Вірусного гепатиту
- E.** Грипу

**72.** Пацієнту ендокринологічного відділення за призначенням лікаря треба підшкірно ввести 36 МО інсуліну (1 мл інсуліну містить 40 МО). Який об'єм розчину лікарського засобу треба набрати в шприц?

- A.** 0,9 мл
- B.** 1,0 мл
- C.** 0,8 мл
- D.** 0,7 мл
- E.** 0,6 мл

**73.** Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 800 000 ОД антибіотика (флакон містить 1 000 000 ОД). Сестра медична розчинила його у співвідношенні 1 : 2 (1 мл розчинника на 200 000 ОД антибіотика). Який об'єм

лікарського засобу треба увести пацієнту внутрішньом'язово?

- A.** 4 мл
- B.** 10 мл
- C.** 8 мл
- D.** 5 мл
- E.** 3 мл

**74.** Яке специфічне місцеве ускладнення інсулінотерапії виникає у разі введення інсуліну в одне й теж місце?

- A.** Ліподистрофія
- B.** Абсцес
- C.** Гематома
- D.** Інфільтрат
- E.** Некроз

**75.** До якого обстеження сестрі медичній треба підготувати пацієнта, у якого є припущення на ішемічний інсульт?

- A.** Магнітно-резонансної томографії
- B.** Рентгенографії кісток черепа
- C.** Ехокардіографії
- D.** Електрокардіографії
- E.** Електроміографії

**76.** У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс — 100/хв, АТ — 100/60 мм рт. ст. Матка напружена, болюча. Положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, серцебиття 160/хв, ритмічне. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- A.** Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- B.** Аборт у ході
- C.** Розрив матки, що відбувся
- D.** Загроза розриву матки
- E.** Неповне передлежання плаценти

**77.** Під час обстеження роділлі виявлено, що спинка плода обернена до правої стінки матки, над входом у малий таз розташована м'яка частина плода, яка не балотує і не має чітких контурів. Яке розташування плода у порожнині матки?

- A.** Друга позиція, тазове передлежання
- B.** Перша позиція, тазове передлежання
- C.** Задній вид, тазове передлежання
- D.** Друга позиція, головне передлежання
- E.** Задній вид, головне передлежання

**78.** Після роботи з електроприладами

чоловік помітив на долоні правої руки біло-сіру пляму діаметром 4 мм. Який вид електротравми виник у чоловіка?

- A.** Знак
- B.** Металізація
- C.** Електроофтальмія
- D.** Опік
- E.** —

**79.** Які заходи (дії) треба включити сестрі медичній у план догляду за пацієнтом з геморагічним інсультом?

- A.** Профілактику гіпостатичної пневмонії
- B.** Промивання шлунку
- C.** Зняття ЕКГ
- D.** Уведення протиблювотних засобів
- E.** Уведення анальгетиків

**80.** Чоловік віком 45 років після емоційного перенапруження раптом відчув різкий головний біль, спостерігається блювання. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Визначається ригідність потиличних м'язів. Артеріальний тиск — 200/110 мм рт.ст. Отриманий у результаті люмбальної пункції ліквор забарвлений кров'ю. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Субарахноїдального крововиливу
- B.** Геморагічного інсульту
- C.** Ішемічного інсульту
- D.** Дисциркуляторної енцефалопатії
- E.** Транзиторного порушення мозково-го кровообігу

**81.** Як називається виробничий фактор, вплив якого призводить до погіршення стану здоров'я і зниження працездатності працівника?

- A.** Шкідливий
- B.** Небезпечний
- C.** Оптимальний
- D.** Допустимий
- E.** —

**82.** Який лікарський препарат використовується насамперед під час надання невідкладної медичної допомоги пацієнту з анафілактичним шоком?

- A.** Епінефрин
- B.** Ампіцилін
- C.** Атропін
- D.** Еритроміцин
- E.** Диклофенак

**83.** Чоловік скаржиться на підвищення

температури тіла, головний біль та різкий розпираючий біль у ділянці задньої поверхні шиї. Під час огляду виявлено щільний інфільтрат темно-червоного кольору, діаметром 7–8 см, різко болючий під час пальпації, покритий дрібними множинними отворами, з яких виділяється гнійна рідина. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Карбункулу
- B.** Фурункулу
- C.** Бешихи
- D.** Контагіозного моллюска
- E.** Дерматофітії

**84.** До якої фармакологічної групи лікарських засобів відноситься діазепам?

- A.** Транквілізатори
- B.** Антиконвульсанти
- C.** Ноотропи
- D.** Міорелаксанти
- E.** Антидепресанти

**85.** Опіки якого ступеня характеризуються появою пухирів різної величини, наповнених прозорою рідиною, на тлі гіперемованої шкіри?

- A.** II
- B.** I
- C.** III
- D.** IV
- E.** —

**86.** Який препарат із групи нейролептиків використовується у пацієнтів з діагнозом: шизофренія, для усунення психомоторного збудження, що супроводжується галюцинаціями та маячними ідеями?

- A.** Аміназин
- B.** Димедрол
- C.** Натрію оксибутират
- D.** Налоксон
- E.** Пірацетам

**87.** Працівники, які обслуговують каналізаційну мережу, відчули в повітрі специфічний запах «тухлих яєць». За одну годину після цього в них з'явилися слюзотеча, різи в очах, кашель, нежить, задишка, біль у грудях, головний біль, запаморочення, нудота. Для отруєння якою хімічною речовиною характерні ці симптоми?

- A.** Сірководнем
- B.** Аміаком
- C.** Хлором
- D.** Фосгеном
- E.** Вуглецю оксидом

**88.** У пацієнта з інсультом спостерігається часткове обмеження довільних рухів у правих кінцівках із підвищенням м'язового тону та фізіологічних рефлексів. Який це вид рухового порушення?

- A.** Центральний геміпарез
- B.** Центральна геміплегія
- C.** Периферичний геміпарез
- D.** Периферична геміплегія
- E.** Центральний парепарез

**89.** До якої функціональної проби треба підготувати пацієнта зі стабільною стенокардією напруження під час виконання плану медсестринських втручань?

- A.** Велоергометрії
- B.** Проби із затримкою дихання
- C.** Синокаротидної проби
- D.** Атропінової проби
- E.** Кліноортостатичної проби

**90.** Яка група лікарських засобів застосовується для лікування рухових порушень після травми мозку?

- A.** Антихолінестеразні
- B.** Ноотропи
- C.** Кортикостероїди
- D.** Міорелаксанти
- E.** Антikonвульсанти

**91.** Для якого захворювання характерним є зниження секреторної та кислотоутворювальної функцій шлунку?

- A.** Хронічного атрофічного гастриту
- B.** Хронічного гіпертрофічного гастриту
- C.** Виразкової хвороби шлунку
- D.** Хронічного панкреатиту
- E.** Цирозу печінки

**92.** Як називається спосіб комунікації, пов'язаний з використанням слів (мови) для передачі інформації?

- A.** Вербальна
- B.** Невербальна
- C.** Офіційна
- D.** Дистанційна
- E.** Виховна

**93.** Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого

порушення мозкового кровообігу?

- A.** FAST
- B.** ABCDE
- C.** NRS
- D.** NIHSS
- E.** MMSE

**94.** Чоловік віком 58 років із тривалим рецидивним перебігом виразкової хвороби шлунку скаржиться на біль в епігастрії постійного характеру, що іррадіює в спину, значне схуднення, відразу до м'ясної їжі. Яке ускладнення, найімовірніше, розвинулося у пацієнта?

- A.** Малігнізація
- B.** Перфорація
- C.** Шлункова кровотеча
- D.** Пенетрація
- E.** Пілоростеноз

**95.** Яке ускладнення розвивається як наслідок ревматоїдного артрити?

- A.** Анкілоз
- B.** Астенія
- C.** Адинамія
- D.** Невралгія
- E.** Гарячка

**96.** Які клінічні прояви найхарактерніші для системної склеродермії?

- A.** Маскоподібне обличчя, рот у вигляді «кисету»
- B.** Еритематозна висипка на обличчі у вигляді «метелика»
- C.** Деформації пальців рук у вигляді «плавників моржа»
- D.** Кільцеподібна еритема на руках і тулубі
- E.** Параорбітальний набряк із пігментацією

**97.** У пологовому будинку новонародженій дитині на 3-й день життя заплановано проведення щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Який спосіб введення цієї вакцини?

- A.** Внутрішньошкірно
- B.** Внутрішньом'язово
- C.** Внутрішньовенно
- D.** Підшкірно
- E.** Перорально

**98.** У чоловіка після значного фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці, що іррадіює вниз живота, часте болісне сечовипускання, виділення кров'янистої сечі. Пацієнт збуджений, спостерігає-

ться блювання. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Напад ниркової кольки
- B.** Напад жовчної кольки
- C.** Харчове отруєння
- D.** Гостра затримка сечі
- E.** —

**99.** Чоловік скаржиться на раптову появу висипу на шкірі та свербіж після вживання полуниці. Під час огляду на шкірі тулуба та кінцівок виявлено червоні плями, пухирі різних розмірів, подряпини, АТ — 120/80 мм рт.ст, пульс — 82 уд/хв. Яке захворювання розвинулося у чоловіка?

- A.** Кропив'янка
- B.** Анафілактичний шок
- C.** Короста
- D.** Набряк Квінке
- E.** Геморагічний васкуліт

**100.** Пацієнту з діагнозом: неврастенія, гіперстенічна форма, призначено бром-електрофорез за методикою Вермеля. Як треба розташувати електроди у цьому разі?

- A.** Один електрод між лопатками, другий — на литковій м'язи
- B.** Один електрод між лопатками, другий — на грудну клітку
- C.** Обидва електроди між правою та лівою лопатками
- D.** Один електрод на потилицю, другий — на попереково-крижову ділянку
- E.** Один електрод на низ живота, другий — на попереково-крижову ділянку

**101.** Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба І ст., призначено електрофорез із 5% розчином сульфату магнію. Яка методика проведення процедури використовується у цьому разі?

- A.** Гальванічний комір за Щербаком
- B.** Півмаска Бергоньє
- C.** Електрофорез за Вермелем
- D.** Електрофорез по Келату
- E.** —

**102.** Вкажіть тривалість прийому родонової ванни.

- A.** 10–15 хв
- B.** 5–7 хв
- C.** 1–2 хв
- D.** 30–40 хв
- E.** 50–60 хв

**103.** Яка з наведених нижче груп лікар-

ських засобів використовується для лікування алергічних захворювань?

- A.** Антигістамінні
- B.** Антиагреганти
- C.** Антациди
- D.** Антагоністи кальцію
- E.** Антидепресанти

**104.** Який симптом є часто позитивним у разі захворювань нирок?

- A.** Пастернацького
- B.** Щоткіна-Блюмберга
- C.** Ортнера
- D.** Кера
- E.** Бабінського

**105.** Чоловік упродовж 10-ти років хворіє на дерматологічне захворювання, що загострюється в осінньо-зимовий період. Під час огляду виявлено: на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок спостерігаються рожево-червоні плями та бляшки, покриті сухими сріблястими лусочками, незначний свербіж. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Псоріазу
- B.** Червоного плоского лишая
- C.** Системного червоного вовчака
- D.** Сухой себореї
- E.** Нейродерміту

**106.** Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для нападу бронхіальної астми?

- A.** Експіраторна задишка
- B.** Біль у грудній клітці
- C.** Інспіраторна задишка
- D.** Шум тертя плеври
- E.** Крепітація

**107.** У пацієнта з діагнозом: пневмонія, підвищилася температура тіла до 39,0°C, шкіра червона, гаряча на дотик, волога. Яку тактику треба застосувати сестрі медичній для зниження температури пацієнту?

- A.** Фізичні методи охолодження
- B.** Поставити банки
- C.** Поставити гірчичники
- D.** Обкласти грілками
- E.** Накласти зігрівальний компрес

**108.** Яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирках?

- A.** УЗД
- B.** Бронхоскопію
- C.** Іригоскопію
- D.** Ректороманоскопію
- E.** Холецистографію

**109.** Яка кровотеча супроводжується виділенням яскраво-червоної пінистої крові під час кашлю?

- A.** Легенева
- B.** Шлункова
- C.** Кишкова
- D.** Носова
- E.** —

**110.** Як називається патологічний стан, що розвивається як ускладнення бронхіальної астми та характеризується повною резистентністю до бронхолітичних засобів?

- A.** Астматичний статус
- B.** Легенева кровотеча
- C.** Анафілактичний шок
- D.** Кардіогенний шок
- E.** набряк легень

**111.** Вкажіть місце накладання електроду з зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- A.** Ліва нога
- B.** Права рука
- C.** Права нога
- D.** Ліва рука
- E.** —

**112.** Який тип мінеральної води треба порекомендувати вживати пацієнту, у якого під час обстеження виявлено наявність сечоокислих каменів у нирках?

- A.** Гідрокарбонатну (лужну)
- B.** Хлоридну
- C.** Сульфатну
- D.** Вуглекислу
- E.** Сірководневу

**113.** Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?

- A.** Гарячка, біль у поперековій ділянці
- B.** Тахікардія, сеча кольору «м'ясних помий»
- C.** Гіпертензія, набряки
- D.** Анурія, свербіж шкіри
- E.** —

**114.** У пацієнта з діагнозом: хронічна ниркова недостатність, розвинулася уремія. Який симптом характерний для цього патологічного стану?

- A.** Аміачний запах з рота
- B.** Підвищення температури тіла
- C.** Збільшення лімфатичних вузлів
- D.** Гіперемія шкірних покривів
- E.** Підвищення апетиту

**115.** Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?

- A.** За Зимницьким
- B.** За Нечипоренко
- C.** За Аддіс-Каковським
- D.** За Амбурже
- E.** —

**116.** У чоловіка віком 65 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово розвинувся напад задишки та кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?

- A.** набряку легень
- B.** Бронхіальної астми
- C.** Інфаркту міокарда
- D.** Серцевої астми
- E.** Туберкульозу

**117.** Як називається порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі?

- A.** Олігурія
- B.** Поліурія
- C.** Полакіурія
- D.** Дизурія
- E.** Ніктурія

**118.** Які клінічні прояви нацхарактерніші для гострого гломерулонефриту?

- A.** Гіпертензія, набряки
- B.** Гіпертермія, гіпотензія
- C.** Гарячка, часте і болісне сечовипускання
- D.** Гіпотензія, біль у поперековій ділянці
- E.** Анурія, свербіж шкіри

**119.** Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість, задишку та кашель із виділенням гнійного з неприємним запахом моротиння у великій кількості (до 1 л на добу). Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Абсцесу легень
- B.** Вогнищевої пневмонії
- C.** Гострого бронхіту
- D.** Раку легень
- E.** Пневмосклерозу

**120.** Під час об'єктивного обстеження

пацієнта сестра медична виявила, що на тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 секунд). Який тип дихання спостерігається у пацієнта?

- A.** Дихання Біота
- B.** Інспіраторна задишка
- C.** Експіраторна задишка
- D.** Дихання Куссмауля
- E.** Дихання Чейна-Стокса

**121.** Яким способом проводиться дренування плевральної порожнини для видалення повітря у разі пневмотораксу?

- A.** По Бюлау
- B.** По Суботіну
- C.** Мікроіригатором
- D.** Трубочастим дренажем
- E.** Стрічковим дренажем

**122.** Які процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції травмованої нижньої кінцівки?

- A.** ЛФК, масаж
- B.** Зігрівальний компрес
- C.** Гірудотерапію
- D.** УФО
- E.** Фототерапію

**123.** Який вигляд мокротиння характерний для раку легень?

- A.** «Малинового желе»
- B.** «Перлинне»
- C.** «Іржаве»
- D.** Пінисте рожеве
- E.** Склоподібне

**124.** Які лікарські засоби застосовуються впродовж усього життя як замісна терапія пацієнтам після струмектомії або тиреоїдектомії?

- A.** Тиреоїдні гормони
- B.** Наркотичні анальгетики
- C.** Антибіотики
- D.** Транквілізатори
- E.** Антидепресанти

**125.** Який із наведених нижче методів дослідження найінформативніший для діагностики туберкульозу легень?

- A.** Рентгенографія органів грудної клітки
- B.** Загальний аналіз крові
- C.** Спірометрія
- D.** Стернальна пункція
- E.** Біохімічний аналіз крові

**126.** За який термін часу треба зібрати сечу на дослідження для визначення вмісту глюкози?

- A.** За добу
- B.** За 10 год
- C.** За 1 год
- D.** За 8 год
- E.** —

**127.** У чоловіка розвинувся напад задишки з різко утрудненим видихом, відчуття стиснення за грудиною, сухий кашель. Об'єктивно спостерігається: положення ортопное, акроціаноз, на відстані чути свистячі хрипи. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Напад бронхіальної астми
- B.** Напад серцевої астми
- C.** Напад ларингостенозу
- D.** Набряк Квінке
- E.** Напад ниркової кольки

**128.** Вкажіть особливість підготовки пацієнта до проведення езофагогастро-дуоденоскопії.

- A.** Дослідження проводиться натще
- B.** Напередодні застосувати харчову клізму
- C.** За 1 годину до обстеження треба випити барій
- D.** Призначити розвантажувальну дієту
- E.** Вранці застосувати олійну клізму

**129.** Вкажіть шлях введення контрастної речовини в кровоносне русло під час проведення холецистографії?

- A.** Внутрішньовенно
- B.** Підшкірно
- C.** Внутрішньошкірно
- D.** Внутрішньом'язово
- E.** Сублінгвально

**130.** Який лікарський засіб використовується у разі консервативного лікування тиреотоксикозу для пригнічення секреції тиреоїдних гормонів?

- A.** Мерказоліл
- B.** Новокаїн
- C.** Преднізолон
- D.** Глюкоза
- E.** Інсулін

**131.** У пацієнтки з ожирінням під час обстеження в ділянці живота та стегон виявлено надлишкове, рівномірне розподілення жирової тканини. Який це вид ожиріння?

- A.** Аліментарно-конституційне
- B.** Церебральне
- C.** Диспластичне
- D.** Гіпотиреоїдне
- E.** —

**132.** Ускладненням якого захворювання є кретинізм?

- A.** Вродженого гіпотиреозу
- B.** Хвороби Іценко-Кушинга
- C.** Нецукрового діабету
- D.** Хвороби Аддісона
- E.** Цукрового діабету

**133.** Споживання продуктів зі збагачених вмістом якого мікроелементу треба порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- A.** Калію
- B.** Кальцію
- C.** Натрію
- D.** Магнію
- E.** Заліза

**134.** Чим треба насамперед промити рану після укусу собаки до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- A.** Мильним розчином
- B.** 10% розчином натрію хлориду
- C.** Розчином фурациліну
- D.** Розчином бетадину
- E.** —

**135.** Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, бажання випорожнити сечовий міхур, сечовиділення відсутнє упродовж 12 год. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Гостра затримка сечі
- B.** Ніктурія
- C.** Ниркова колька
- D.** Поліурія
- E.** Олігурія

**136.** Вкажіть прояви дизуричного синдрому.

- A.** Часте болісне сечовипускання
- B.** Позитивний симптом Пастернацького
- C.** Піурія, протеїнурія
- D.** Альбумінурія, кетонурия
- E.** Гіпертензія, набряки

**137.** Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

- A.** Свербіж шкіри
- B.** Іктеричність шкіри
- C.** Сльозотеча
- D.** Ціаноз шкіри
- E.** Мерзлякуватість

**138.** Жінці віком 35 років діагностовано залізодефіцитну анемію. Які продукти харчування мають бути у достатній кількості в раціоні харчування жінки?

- A.** М'ясні продукти
- B.** Овочі і фрукти
- C.** Борошняні вироби
- D.** Молочні продукти
- E.** Морська капуста

**139.** Який метод дослідження використовується для діагностики лейкозів?

- A.** Стернальна пункція
- B.** Біохімічний аналіз крові
- C.** Імунологічний аналіз крові
- D.** Коагулограма
- E.** Загальний аналіз сечі

**140.** Вкажіть типовий симптом, характерний для хронічної серцевої недостатності.

- A.** Набряки на нижніх кінцівках
- B.** Набряки на обличчі
- C.** Підвищення температури тіла
- D.** Крововиливи на шкірі
- E.** Пітливість

**141.** Як називається метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура?

- A.** Цистоскопія
- B.** Бронхоскопія
- C.** Ректороманоскопія
- D.** Колоноскопія
- E.** Езофагогастродуоденоскопія

**142.** Сестра медична у пологовому будинку проводить підготовку новонародженої дитини з масою тіла 2300 г до щеплення проти туберкульозу. Яку вакцину вона застосує?

- A.** БЦЖ-М
- B.** БЦЖ
- C.** «Пріорікс»
- D.** «Пентаксім»
- E.** «Інфанрікс»

**143.** Вода якої температури використовується для процедури постановки гірчичників?

- A. 39–40°C
- B. 25–27°C
- C. 20–25°C
- D. 18–20°C
- E. —

**144.** Під яким кутом вводиться голка у верхньо-зовнішній квадрант сідниці під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції?

- A. 90°
- B. 70°
- C. 45°
- D. 30°
- E. 15°

**145.** Який засіб контрацепції використовується для запобігання незапланованої вагітності та інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом?

- A. Презерватив
- B. Внутрішньоматкова спіраль
- C. Сперміциди
- D. Шийковий ковпачок
- E. Хірургічна стерилізація

**146.** Вкажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки.

- A. Гірудин
- B. Гепарин
- C. Гістамін
- D. Лізоцим
- E. Фібринолізин

**147.** Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення щеплення БЦЖ?

- A. Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча
- B. Підлопаткова ділянка
- C. Верхній зовнішній квадрант сідниці
- D. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- E. Передня поверхня стегна

**148.** У якій лабораторії проводиться дослідження носоглоткових змивів на грип та ГРВІ?

- A. Вірусологічний
- B. Клінічний
- C. Бактеріологічний
- D. Імунологічний
- E. Біохімічний

**149.** Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запальним процесом та/або порушенням рухливості у ньому?

- A. Арталгія
- B. Артрит
- C. Артроз
- D. Поліартрит
- E. Полікістоз

**150.** У чотирирічної дитини спостерігаються напади спазматичного кашлю з репризами. Який матеріал треба взяти для проведення лабораторного дослідження у цьому разі?

- A. Слиз методом «кашльових пластинок»
- B. Змиви із носоглотки
- C. Мокротиння
- D. Промивні води бронхів
- E. Промивні води шлунку